

# EPISODE 5-2

▼ Surgeon




▼ Data

【患部】肝臓

【バイタル】40(75)

【手術時間】5:00:00

▼ Notes




— 不幸は身近に —

事故により、内臓損傷を起こしている患者を治療する。開いた傷口に人工皮膚を乗せるガーゼパッキング処理に挑むことになる。

## The patient's Life is in your hands

- 1 腹部を消毒して切開 (切開→P24)
- 2 カウンターショックで心拍を復活させる
- 3 血溜まりをすべて吸引する (血溜まり→P24)
- 4 追加トレイの人工膜を損傷部分(8カ所)すべてに置く(ガーゼパッキング→P35)
- 5 人工膜を定着させる(ガーゼパッキング→P35)
- 6 心細動が発生(心細動→P31)
- 7 裂傷×6を縫合(裂傷→P23)
- 8 腹部の閉創処置を行なう(閉創→P25)

## The patient is saved



1  
すぐに心停止が発生してバイタルが低下するため、切開時はバイタルの回復をしないですそのまま手順を進めよう。



4  
損傷部以外の血溜まりまですべて吸引してあげれば、心細動が発生するまで血溜まりは再発しない。



5-1  
人工膜を8カ所すべてに置く。血溜まりは発生しなくなる。あとはヒールゼリーを塗り、皮膚を定着させよう。



5-2  
人工膜を配置中に1回目の心細動が発生する。本震に移行したときに処置をするとミスになる。




7  
2回目の心細動が本震になるまでに裂傷をすべて縫い終わりたい。難しいなら手を休めて次の準備をしておこう。



8  
バイタルが低下しているの、高得点クリアを狙うなら、保護テープを張るまでにバイタルを最大まで回復させる。

## ■ 血溜まりの再発タイミング



肝臓の破損部分は、マスごとに血溜まりの発生タイミングが設定されている。全部で4段階あり、左図に記した①②③④の順で再発が早くなる。

## SPECIAL BONUS

SPECIAL BONUS 獲得条件

Miss 判定無し

〇〇秒以上残して手術終了※

MAX CHAIN 〇〇〇以上

剥がれた人工膜の枚数〇〇枚以下

※分表示ではそれぞれ、Easy2:40 Normal3:00 Hard3:05

Easy Normal Hard 倍率

220 240 245 1.2

25 30 32 1.2

12 8 3 1.3

## OPERATION RANK

ランク Easy Normal Hard

C 0 ~ 1799 0 ~ 2899 0 ~ 4299

B 1800 ~ 1999 2900 ~ 3199 4300 ~ 4599

A 2000 ~ 2099 3200 ~ 3499 4600 ~ 4999

S 2100 ~ 3500 ~ 5000 ~ 5099

XS — — 5100 ~

# EPISODE 5-3

▼ Surgeon




▼ Data

【患部】肝臓

【バイタル】65(90)

【手術時間】5:00:00

▼ Notes



— 暗転 —


ガーゼパッキング処理で治療した肝臓の再手術を行なう。症状が悪化した原因を突き止めるべく、再び術式を開始する。

## The patient's Life is in your hands

- 1 腹部を消毒して切開 (切開→P24)
- 2 肝臓の左下に発生している血溜まり×3のみを吸引(血溜まり→P24)
- 3 血溜まりの下にあった内出血×3を特定し、患部を切開(内出血→P29)
- 4 内出血の血溜まり×3を吸引し、吸引した順番で切開×3を縫合(内出血→P29)
- 5 肝臓の右上に発生している血溜まり×3のみを吸引(血溜まり→P24)
- 6 血溜まりの下にある内出血×4を特定し、3~5の手順で内出血を処置(内出血→P29)
- 7 心細動が発生(心細動→P31)
- 8 損傷部分の血溜まりが発生しなくなるまで吸引(ガーゼパッキング→P35)
- 9 ピンセットを選択し、追加トレイの人工皮膚を損傷部分(8カ所)すべてに置く(ガーゼパッキング→P35)
- 10 人工膜を定着させる(ガーゼパッキング→P35)
- 11 腹部の閉創処置を行なう(閉創→P25)

## The patient is saved

## ■ 血溜まりの再発タイミング



72ページと同じように肝臓の破損部分には、マスごとに血溜まりの発生タイミングが設定されている。左図に記した①②③④の順で再発が早くなる。



2  
内出血の影を表示させずに切開したほうが得点が高くなる。近辺にメスを入れ、スライドし続けて切開しよう。



4  
内出血の血溜まりは再発が早い。縫合するときは吸引した順に縫わないと、途中で血溜まりが発生してしまう。



7-1  
手順が遅いと内出血の処置中に心細動が発生する場合がある。必ず手を止めて正常に戻るまで待機すること。



7-2  
心細動が発生し、一定時間経過したときに作業を行なっていると「Miss」判定になり、必ず心停止が起きる。



8-1  
吸引中に再発した血溜まりも合わせて一気に吸引しよう。損傷部分の血溜まりがなくなったら次の手順へ進む。



8-2  
血溜まりを途中で吸引したものの、心細動で手を止めた場合は、破損部分の血溜まりが再発するまで待つ。

## SPECIAL BONUS

SPECIAL BONUS 獲得条件

Miss 判定無し

〇〇秒以上残して手術終了※

MAX CHAIN 〇〇〇以上

剥がれた人工膜の枚数〇〇枚以下

※分表示ではそれぞれ、Easy2:30 Normal3:00 Hard3:10

Easy Normal Hard 倍率

150 180 190 1.2

40 50 60 1.2

15 10 6 1.3

## OPERATION RANK

ランク Easy Normal Hard

C 0 ~ 2499 0 ~ 3799 0 ~ 5299

B 2500 ~ 2699 3800 ~ 4099 5300 ~ 5599

A 2700 ~ 2799 4100 ~ 4499 5600 ~ 5899

S 2800 ~ 4500 ~ 5900 ~ 5999

XS — — 6000 ~